



Bitte
beantworten Sie
die CME-Fragen ab
jetzt online unter
[www.elsevier.de/
leitlinien-paediatric](http://www.elsevier.de/leitlinien-paediatric)

Leitlinien Kinder- und Jugendmedizin – CME-Fragen zur 18. Nachlieferung

Fragen zu Kapitel H Rheumatologie (H9) und Kapitel V Dermatologie (V2)

Es ist immer **nur eine Antwort pro Frage** zutreffend. **Einsendeschluss ist der 18.06.2010.**
Wenn Sie mindestens 70% der Fragen korrekt beantwortet haben, erhalten Sie **2 CME-Punkte.**
Bei richtiger Beantwortung von 100% der Fragen bekommen Sie **3 CME-Punkte.**

1. **Voraussetzungen für die Diagnose einer juvenilen idiopathischen Arthritis sind, dass**
 1. der Patient jünger als 5 Jahre alt ist.
 2. eine Schwellung, Bewegungseinschränkung und Schmerz eines Gelenkes bestehen.
 3. mindestens 3 Gelenke von der Arthritis betroffen sind.
 4. die Arthritis mindestens 1 Tag besteht.
 5. eine Uveitis vorliegt.
 6. der Antistreptolysintiter positiv ist.

A Nur Antwort 2 ist richtig.
B 1–4 sind richtig.
C Alle sind richtig.
D 1, 2 und 4 sind richtig.
E Alle sind falsch.
2. **Bei einer juvenilen idiopathischen Arthritis mit systemischem Beginn (M. Still) treten typischerweise folgende Symptome auf:**
 1. Arthritis in einem oder mehreren Gelenken
 2. Fieber
 3. Exanthem
 4. Lymphknotenschwellung
 5. Mitralinsuffizienz
 6. Nephrotisches Syndrom
 7. Chorea

A 1 und 2 sind richtig.
B 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
C 1 bis 5 und 7 sind richtig.
D Alle sind richtig.
E Alle sind falsch.
3. **Zu den Diagnosekriterien einer Kawasaki-Erkrankung gehört:**
 1. Eine Temperatur von 39–40 °C, Dauer: 5 Tage oder mehr
 2. Konjunktivitis
 3. Lymphadenopathie (zervikal, oft einseitig und > 1,5 cm im Durchmesser)
 4. Hautausschlag polymorph, keine Vesikel oder Krusten
 5. Veränderungen der Lippen oder der Mundschleimhaut (trocken, geschwollen, gerötet, mit Einrissen oder Erdbeerzunge oder diffus geröteter Rachen)

A Nur 2 ist richtig.
B 1 bis 4 sind richtig.
C Alle sind richtig.
D 1, 2 und 4 sind richtig.
E Alle sind falsch.
4. **Autoinflammatorische Syndrome oder hereditäre periodische Fiebersyndrome sind gekennzeichnet durch:**
 1. Selbstlimitierende rezidivierende Fieberschübe
 2. Symptomfreies Intervall
 3. Multisystemische Inflammation
 4. Nachweis von Entzündungsparametern
 5. Kein Erregernachweis
 6. Selbstlimitierende rezidivierende Fieberschübe
 7. Symptomfreies Intervall

A 1 und 2 sind richtig.
B 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
C 1 bis 5 und 7 sind richtig.
D Alle sind richtig.
E Alle sind falsch.

Leitlinien Kinder- und Jugendmedizin – CME-Fragen zur 18. Nachlieferung

Fragen zu Kapitel H Rheumatologie (H9) und Kapitel V Dermatologie (V2)

5. **Zu den Biologicals gehören:**
1. Etanercept
 2. Infliximab
 3. MTX
 4. Ibuprofen
 5. Ciclosporin A
- A 1 und 2 sind richtig.
B 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
C 1 bis 5 sind richtig.
D Alle sind richtig.
E Alle sind falsch.
6. **Typisch für das familiäre Mittelmeerfieber sind:**
1. Die Fieberdauer ist selten länger als 3 Tage
 2. 90% der Fälle beginnen im Alter < 20 Jahre
 3. Bauchschmerzen
 4. Polyserositis
 5. Synovitis, asymmetrische Arthritis
- A Nur 2 ist richtig.
B 1 bis 4 sind richtig.
C Alle sind richtig.
D 1, 2 und 4 sind richtig.
E Alle sind falsch.
7. **Welche Aussage ist falsch? Topisch angewendete Salicylsäure kann folgende Eigenschaften aufweisen:**
- A Keratolyse.
B Permeationserhöhung für z.B. topische Steroide.
C durch transkutane Resorption metabolische Azidose.
D Irritation.
E antipruriginös.
8. **Zu den kongenitalen, isolierten Ichthyosen zählen:**
- A Sjögren-Larsen-Syndrom.
B Ichthyosis vulgaris.
C ARCI.
D Comèl-Netherton-Syndrom.
E Harlekin-Ichthyose.
9. **Folgende Aussage zu einzelnen Ichthyosen trifft nicht zu:**
- A Beim Comèl-Netherton-Syndrom können ekzemartige Schübe auftreten, die eine antiphlogistische Therapie erfordern.
B Die bullöse kongenitale ichthyosiforme Erythrodermie ist durch häufige bakterielle Superinfektion gekennzeichnet.
C Der therapeutische Nutzen einer lipidarmen Diät beim Sjögren-Larsen-Syndrom wird kontrovers diskutiert.
D Bei der Harlekin-Ichthyose kann es durch den Hornpanzer zu Beugekontrakturen kommen.
E Die Ichthyosis vulgaris bevorzugt die Gelenkbeugen.
10. **Zur Keratolyse bei Ichthyosen ist nicht geeignet:**
- A Topische Steroide.
B Orale Retinoide.
C Topische Retinoide.
D Bäckerhefe.
E Mechanische Keratolyse.